

РАК ШЕЙКИ МАТКИ


Восточная Европа и Центральная Азия



ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ УДЕЛЯТЬ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ВНИМАНИЕ ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ?

- Рак шейки матки негативно сказывается на эмоциональном состоянии и социальных аспектах жизни женщин и их семей, а также требует значительных финансовых затрат от системы здравоохранения.
- В первую очередь рак поражает в молодых трудоспособных женщин на пике их карьерного роста и исполнения обязанностей по уходу за другими членами семьи.
- Практически каждый случай рака шейки матки может быть предотвращен.
- Большинство случаев заболевания раком шейки матки наблюдается в странах с низким и средним уровнем доходов, где нет программ по профилактике рака шейки матки.
- Почти во всех странах региона скрининг проводится лишь по просьбе врача или пациента. Такой подход не обеспечивает в достаточной мере выявляемости данного заболевания среди групп населения наиболее подверженных его развитию.

СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ



СВК: Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин
Источник: Globocan 2018


В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ?

- Практически каждый случай рака шейки матки может быть предотвращен путем внедрения хорошо организованных, научно-обоснованных и легкодоступных программ скрининга рака шейки матки в сочетании с вакцинацией девочек-подростков от вируса папилломы человека (ВПЧ) - распространенного вируса, передаваемого половым путем и способного вызывать рак.
- Программы организованного скрининга должны обеспечивать систематическое привлечение женщин к тестированию, контроль их посещаемости и последующее наблюдение, а также высокое качество всех составляющих услуг. Таким образом обеспечивается максимально широкий охват населения и наиболее экономически эффективное снижение заболеваемости раком.
- Скрининг рака шейки матки в большинстве стран Восточной Европы и Центральной Азии основан на цитологии шейки матки (Пап-тест). Однако для стран с налаженной системой наблюдения за женщинами с положительным скрининговым результатом,

тестирование на ВПЧ высокого риска может стать более эффективным выбором для скрининга.

- Несмотря на то что большинство стран региона предлагают бесплатный скрининг и лечение рака шейки матки, очень немногие из них возмещают расходы за последующее наблюдение женщин с положительным результатом скрининга или лечение предраковых поражений; хотя именно эти меры являются неотъемлемыми элементами успешной программы профилактики. Все услуги, связанные со скринингом, от первого тестирования до лечения преинвазивных форм заболевания, а также самого рака, должны предоставляться бесплатно всем женщинам возрастной группы, подлежащей скринингу.
- Программы бесплатной вакцинации подростков от ВПЧ имеют решающее значение для снижения заболеваемости раком шейки матки. В большинстве стран региона такую вакцинацию предлагают преимущественно частные учреждения на платной основе.
- Для смягчения социального и экономического бремени рака шейки матки рекомендуется создать национальные механизмы по обеспечению высокого качества скрининговых услуг и равного доступа к ним всех женщин целевой группы населения.

ЧИСЛО ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В СТРАНАХ РЕГИОНА ВЕЦА



46.000

ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ В ГОД

21.000

ЧИСЛО СМЕРТЕЙ В ГОД

2й

ПО СМЕРТНОСТИ РАК СРЕДИ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО

ВОЗРАСТА

90%

ВСЕХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ